

**Tabla 2. Artículos incluidos terapia combinada**

Estudios terapia combinada							
Autores	País	Año	Medicación	Procedimiento	Dosis nefopam	E f e c t o analgésico	Requerimiento m e d i c a c i ó n rescate
Lekprasert et al.	Tailandia	2021	Nefopam - parecoxib vs parecoxib - placebo	C i r u g í a ginecológica	Nefopam 20 mg + parecoxib 40 mg	1 h: p = 0,16 6 h: p = 0,14 12 h: p = 0,03 24 h: p = 0,43	p = 0,97
Oh et al.	Corea	2018	Nefopam - fentanil vs ketorolac - fentanil	C i r u g í a artroscópica ortopédica	Nefopam 20 mg, fentanil 2mcg/kg e infusión 1,2 mg/h y 0,02 mcg/kg/h fentanil con bolo demanda nefopam 1,2 mg y fentanil 0,02 mcg/kg	p = 0,48	p = 0,32
Jin et al.	Corea	2016	Fentanilo vs fentanilo + nefopam	Laparotomía	1.250 Ug de fentanilo + 120 mg de nefopam	1 h: p = < 0,0001 2 h: p = < 0,0001 6 h: p = < 0,0001 12 h: p = < 0,0001 24 h: p = < 0,0001	p = 0,001
Na et al.	Corea	2016	Nefopam - ketorolac vs ketorolac	C i r u g í a de cáncer de mama	Nefopam 20 mg - ketorolac 30 mg	UCPA: p=0,005 6 h: p = 0,001 24 h: p = 0,01	p = 0,009
Lee et al.	Corea	2013	N e f o p a m v s nefopam+ fentanilo	Colecistectomía por laparoscopia	Nefopam 20 mg + fentanil 50 mcg Nefopam 40 mg + fentanil 50 mcg	10 min: p = 0,005 30 min: p = 0,005 1 h: p = 0,005 2 h: p = 0,005 6 h: p = 0,005 12 h: p = 0,005 10 min: p = 0,005 30 min: p = 0,005 1 h: p = 0,005 2 h: p = 0,005 6 h: p = 0,005 12 h: p = 0,005	p = < 0,05
Lee et al.	Corea	2021	Fentanilo vs nefopam vs Fenataniilo + nefopam	C i r u g í a ginecológica laparoscópica	Nefopam bolo 6 mg infusión 2 mg/h bolo PCA 2 mg	UCPA: p=0,063 6 h: p = 0,020 24 h: p = 0,015 48 h: p = 0,328	No reportado
Mimoz et al.	Francia	2001	Nefopam + morfina vs Morfina vs proparacetamol + morfina	R e s e c c i ó n hepática electiva	Morfina PCA 1 mg + nefopam 20 mg cada 4 h	Reposo 1 h: p no significativa, no reportada 4 h: p < 0,05 24 h: p < 0,05 Toser 1 h: p no significativa, no reportada 4 h: p no significativa, no reportada 24 h: p < 0,05	p < 0,05
Moffat et al.	Inglaterra	1990	N e f o p a m v s diclofenac vs nefopam + diclofenaco	C i r u g í a abdominal superior	Nefopam 20 mg IM Nefopam 20 mg + diclofenaco 75 mg IM	p < 0,01	p < 0,01
Pinsornsak et al.	Tailandia	2022	Nefopam + naproxeno + acetaminofen + gabapentin + bloqueo canal aductores + analgesia infiltrativa vs naproxeno + acetaminofen + gabapentin + bloqueo canal aductores + analgesia infiltrativa	R e e m p l a z o total de rodilla primario	Nefopam 80 mg + naproxeno 250 mg + acetaminofen 1 g + bloqueo canal aductores 20 cc bupivacaina 0,5% + analgesia infiltrativa 100 mg bupivacaina y morfina 5 mg	Reposo 6 h: 0,01 12 h: 0,12 18 h: 0,45 24 h: 0,49 30 h: 0,53 36 h: 0,42 42 h: 0,25 48 h: 0,76 Movimiento 6 h: 0,12 12 h: 0,55 18 h: 0,34 24 h: 0,73 30 h: 0,58 36 h: 0,62 42 h: 0,12 48 h: 0,87	0-12 h: p = 0,21 12-24 h: p = 0,13 24-36 h: p = 0,02 36-48 h: p = 0,59 Total: p = 0,03
Yeo et al.	Coreo	2022	N e f o a p m + hidromorfona + paracetamol vs hidromorfona + paracetamol	Lobectomía pulmonar por toracoscopia video asistida	Nefopam 20 mg + hidromorfona 0.01 mg/kg + paracetamol 1 g	Recuperación: 0,355 6 h: 0,999 12 h: 0,999 24 h: 0,999 72 h: 0,999	p = 0,302
Aveline et al.	Francia	2009	Nefopam - morfina vs Ketamina - morfina vs morfina	Reemplazo de rodilla	Nefopam bolo 0,2 mg/kg infusión 120 mcg/kg/h durante cirugía e infusión 60 mch/kg/h por 48 h + morfina 0,15 mg/kg	p < 0,05 (favor ketamina)	No diferencia estadísticamente significativa, p no reportada
Chalerm-kitpanit et al.	Tailandia	2022	Nefopam - parecoxib vs Parecoxib	C i r u g í a de columna mínimamente invasiva	Nefopam bolo 20 mg + infusión 3.3 mg/kg/h por 24 h + parecoxib 40 mg	No diferencia significativa p no reportada	p = 0,41
Jung et al.	Corea	2021	N e f o p a m v s Nefopam+ fentanilo	Colecistectomi laparoscópica	Nefopam 4 mg/h + bolo 4 mg	UCPA: p=0,881 8 h: p = 0,605 24 h: p = 0,103	p = 0,481